



新型コロナウイルス

Q. なぜ、小児(5～11歳)の接種が必要なの？

A. 小児においても中等症や重症例が確認されており、特に基礎疾患を有するなど重症化するリスクが高い小児には接種の機会を提供することが望ましいとされています。また、今後さまざまな変異株が流行することも想定されるため、小児を対象にワクチン接種を進めることとされました。



Q. 子どもがワクチンを受けた後は、どんな症状が出るの？

A. 注射した部分の痛みが一番多く現れます。ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽度または中等度であり、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められないと判断されています。

数日以内に起こることがある症状

症状が出た人の割合	症 状
50%以上	注射した部分の痛み、疲れた感じ
10～50%	頭痛、注射した部分の赤み・はれ、筋肉痛、寒気
1～10%	下痢、発熱、関節痛、嘔吐

※接種後7日間にみられたさまざまな症状(1回目または2回目のいずれか)

Q. 若い男性ほど接種後に心筋炎を発症しやすいと聞くけど、子どもはどう？

A. アメリカでは、12～17歳の男性に比べ、5～11歳の男性の方が、心筋炎が報告される割合は低いとされています。ワクチン接種後4日程度の間にお子さまの胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状が見られた場合は速やかに医療機関を受診してワクチンを受けたことを伝えてください。なお、心筋炎と判断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

新型コロナワクチンに関する問い合わせ先

- 津市のワクチン接種の手続きや予約
津市新型コロナワクチン接種予約・相談電話窓口
(コールセンター)
☎ 0120-059-550 (8時30分～18時、土・日曜日、祝・休日可)
- ワクチン接種前後の副反応に関する質問・相談
三重県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口
☎ 224-3326 (24時間対応可)
- ワクチンの安全性、有効性など制度全般
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎ 0120-761-770 (9時～21時、土・日曜日、祝・休日可)
- 津市ホームページ「新型コロナワクチン接種」

HP 津市 ワクチン

検索



2回目接種完了から6カ月を経過した18歳以上の人を対象とした新型コロナワクチン追加接種(3回目)については、広報津3月16日号でお知らせしています。

この春も基本的な感染対策の徹底を！

コロナ禍で3度目の春を迎えています。お花見や歓迎会の季節ですが、大人数や長時間に及ぶ飲食は感染リスクが高まる場面となるため注意が必要です。

また、日々の寒暖差や生活環境の変化で体調を崩しやすい季節でもあります。栄養バランスの取れた食事を3食取る、十分な睡眠を取るなど、規則正しい生活を心掛け日頃から体調管理をしっかり行いましょう。

飲食の場面では…



- 少人数・短時間にする
- 会話の際は必ずマスクを着用する
- 感染防止対策が徹底されている飲食店を利用する

旅行などで出掛けるときは…

- 行き先の感染状況や移動に関する指針など、最新の情報をよく確認して移動を検討する

