

## 接種体制

個別接種
オミクロン株対応2価ワクチン(ファイザー)、従来型ワクチンを接種できます。
<b>接種場所</b> 市内の医療機関
<b>予約方法</b> 津市ホームページの接種協力医療機関一覧から施設を選び、直接予約してください。
 接種協力医療機関一覧

集団接種
オミクロン株対応2価ワクチン(モデルナ)を接種できます。
<b>接種場所</b>
•津センターパレス1階(大門7-15) •久居インターナショナル内(久居明神町2490)
<b>予約方法</b> 電話で津市新型コロナワクチン接種予約・相談電話窓口(コールセンター)へ、または津市新型コロナワクチン接種予約サイトから
 接種予約サイト
 <b>0120-059-550</b>

## オミクロン株対応2価ワクチンの効果

### ・従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果

オミクロン株対応2価ワクチンにはオミクロン株に由来する成分が含まれるため、従来型ワクチンと比較した場合、オミクロン株に対する重症化予防効果、感染予防効果、発症予防効果を発揮する免疫の発生をより強く誘導します。そのため、オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、持続期間が短い可能性があるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されます。

### ・2価のワクチンのため、さまざまな新型コロナウイルスに反応

異なる2種類の抗原があることにより、誘導される免疫も、より多様な新型コロナウイルスに反応すると考えられます。そのため、今後の変異株に対しても有効である可能性がより高いことが期待されています。 ※2022年8月現在の科学的知見を踏まえた専門家の議論をもとに記載しています。

## オミクロン株対応2価ワクチンの安全性

副反応としてはファイザー社とモデルナ社の2価ワクチンの薬事承認において、どちらのワクチンも従来型ワクチンとおおむね同様の症状が見られました。

### 接種後7日間に現れた副反応

発現割合	副反応の内容	
	ファイザー社	モデルナ社
50%以上	注射部位の痛み	注射部位の痛み、倦怠感
10~50%	倦怠感、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛	頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節腫脹、悪寒、恶心・嘔吐
1~10%	下痢、発赤、腫脹(はれ)、発熱、嘔吐	紅斑・発赤、腫脹・硬結(はれ・しこり)、発熱

<出典>厚生労働省 特例承認による報告書より改編

## 新型コロナワクチンに関する問い合わせ先

- 津市のワクチン接種の手続きや予約  
**津市新型コロナワクチン接種予約・相談電話窓口(コールセンター)**  
 **0120-059-550** (8時30分～18時、土・日曜日、祝・休日も可)
- ワクチン接種前後の副反応に関する質問・相談  
**三重県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口**  
 **224-3326** (24時間対応可)

- ワクチンの安全性、有効性など制度全般  
**厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター**  
 **0120-761-770** (9時～21時、土・日曜日、祝・休日も可)

- 津市ホームページ  
**「新型コロナワクチン接種」**  
